

Visualização de Construções Geométricas

Pedro Quaresma
Departamento de Matemática, Universidade de Coimbra
3001-454 COIMBRA, PORTUGAL
pedro@mat.uc.pt

Ana Pereira
Núcleo de Estágio Pedagógico
Lic. Matemática, F.C.T.U.C.
Escola B. 2, 3 c/ Sec. José Falcão, Miranda do Corvo
pereir22@iol.pt

19 de Dezembro de 2006

1 Introdução

No âmbito dos Estágios Pedagógicos da Licenciatura em Matemática, Ramo Educacional, do Departamento de Matemática da F.C.T.U.C. foi proposto como trabalho científico a formalização dos resultados geométricos apresentados, em geral sem demonstração, no 3º ciclo¹. No decurso desse trabalho foi identificada a necessidade de uma ferramenta computacional capaz de, a um tempo visualizar as diferentes construções geométricas, e por outro lado permitir a inclusão dessas construções num dado texto matemático, sejam notas de apoio, testes de avaliação, ou um outro qualquer texto que verse a Geometria Euclidiana. Note-se que, no que diz respeito ao processamento de textos, aponta-se para a utilização do processador \LaTeX [1, 4]².

A ferramenta encontrada foi o programa **eukleides** [2, 3] que, embora desenvolvido num ambiente *Linux/X-windows*, está também disponível no ambiente *MS-Windows*. Como se verá de seguida esta ferramenta permite responder às necessidades acima referidas e até ultrapassá-las. Com este programa é possível:

- descrever uma construção geométrica através de elementos construtivos básicos – *linguagem eukleides*;
- transformar as descrições em comandos legíveis pelo \LaTeX – *conversor eukleides*;

¹Ana Pereira, Demonstrações Geométricas, Primeiro Trabalho Científico, Estágio Pedagógico, Licenciatura em Matemática - Ramo Educacional, F.C.T.U.C., 2004.

²GUTpt, Grupo de utilizadores de (La)TeX Portugal, <http://gentzen.mat.uc.pt/~gutpt>
TUG, TeX User Group, <http://www.tug.org>.

- editar e visualizar as descrições. Podem-se acrescentar elementos interactivos nas construções geométricas – *editor/interpretador/visualizador* **xeukleides**.

Como se pode ver por esta lista, além das tarefas que tinham sido identificadas, e que foram resolvidas, acrescenta-se ainda a possibilidade de criar construções geométricas com um certo grau de interacção, o que, como se verá mais à frente, permite ilustrar algumas das demonstrações de resultados geométricos.

No seguimento apresentam-se alguns dos aspectos do *Sistema eukleides*.

2 O Sistema eukleides

Aquilo que se convencionou chamar o *Sistema eukleides* pode ser dividido em três componentes: uma linguagem de especificação para a descrição de figuras em Geometria Euclidiana, e dois programas capazes de interpretar essa mesma linguagem: **eukleides**, o conversor para o formato \LaTeX+pstricks ; **xeukleides**, um editor e visualizador. De seguida descreve-se cada uma destas facetas do sistema **eukleides**.

2.1 A Linguagem

A linguagem de especificação **eukleides** utiliza os construtores básicos da Geometria Euclidiana para especificar as figuras, por exemplo:




Figura 1: Teorema de Tales

foi produzido a partir dos seguintes comandos:

```
A=ponto(0,0); B=ponto(6,0)
c=círculo(A,B)
C=ponto(c,45:)
desenhar(c,0:,180:)
desenhar(A,B,C)
marca(A,C,B,recto)
```

Quais são então os construtores da linguagem **eukleides**? A resposta a esta pergunta é dada pelo manual que acompanha o programa [2, 3]. No que se segue dá-se somente uma descrição breve dos vários construtores existentes, os quais se agrupam nos três tipos genéricos seguintes:

Tipos Numéricos Números reais e ângulos em graus. Estão disponíveis os habituais operadores aritméticos, assim como as funções pré-definidas usualmente disponíveis em linguagens de programação.

Medidas Geométricas Está disponível um conjunto extenso de funções de informação numérica sobre os vários objectos geométricos. Por exemplo dado um ponto A , tem-se que `abcissa(A)` é o valor da abcissa de A no referencial ortonormado definido.

Construtores Geométricos Conjunto extenso de construtores através dos quais se definem os vários objectos que depois se pode decidir «desenhar». Os elementos básicos que se podem especificar são: vectores; pontos; linhas rectas; segmentos de recta; círculos; cónicas; triângulos; polígonos.

Eis um outro exemplo:

```
caixa(-3,-1,9,14)
A B C D quadrado(6)
C E F G quadrado(3*sqrt(3),60:)
D G H I quadrado(3,60:)
J = projecção(G,linha(A,B))
desenhar(A,B,C,D)
desenhar(C,E,F,G)
desenhar(D,G,H,I)
desenhar(segmento(G,J),tracejado)
desenhar(segmento(G,A),pontead)
desenhar(segmento(G,B),pontead)
desenhar(segmento(D,E),pontead)
desenhar(segmento(C,I),pontead)
marca(C,G,D,recto)
marca(B,J,G,recto)
```

são os comandos necessários para se obter a figura 2.

2.2 O Conversor eukleides

O programa `eukleides` funciona como um compilador capaz de reconhecer textos na linguagem `eukleides` e os traduzir para a linguagem do sistema `LATEX+pstricks`. A sua utilização é muito simples bastando na linha de comando («`bash`», «`msdos`», ou outra) escrever o comando (aplicado à figura anterior):

```
eukleides pitagoras.euk > pitagoras.tex
```

para se obter o ficheiro «`pitagoras.tex`» contendo os comandos `LATEX+pstricks` necessários para a criação da figura especificada em «`eukleides.euk`».




Figura 2: Teorema de Pitágoras

De seguida basta³ incluir o ficheiro «`pitagoras.tex`» no local aonde queremos ver inserida a figura.

2.3 O Visualizador `xeukleides`

O `xeukleides` é, a um só tempo, um editor, um interpretador e um visualizador, sendo que nesta última função acrescenta a possibilidade de construir figuras interactivas. Tendo tudo isto em conta não é de estranhar que, de certa forma, esta componente seja a mais utilizada pelo utilizador.

A interface simples mas muito eficaz do `xeukleides` permite ao utilizador criar as figuras geométricas que deseja com muita facilidade e rapidez (figuras 3 e 4).

O menu «Visualizar» permite passar do modo de edição para o modo de visualização, momento em que o interpretador é chamado a intervir e, caso hajam erros, é dada a indicação da linha onde ocorreu o primeiro erro. Caso não haja nenhum erro é então visualizada a figura.

Como já foi dito o `xeukleides` permite definir figuras interactivas, isto é, figuras em que um dos seus elementos (em geral um ponto) se pode movimentar de acordo com os comandos do utilizador na altura da visualização. Recuperando o exemplo referente ao Teorema de Tales pode-se construir a figura 5 através da seguinte especificação:

```
A=ponto(0,0); B=ponto(6,0)
c=círculo(A,B)
x interactivo(45,-2,0,180,"C",paraolado)
C=ponto(c,x:)
```

³É necessário que o texto aonde é feita a inserção contenha, no preâmbulo, o comando `\include{pstricks}`.

```
Xeukleides - pitagorasPT.euk
Ficheiros  Visualizar  Ajuda
% This is the classical Vecten's figure used by Eucl
id
% to demonstrate Pythagoras' theorem.
% Copyright (c) Christian Obrecht 2001

caixa(-3,-1,9,14)
A B C D quadrado(6)
C E F G quadrado(3*sqrt(3),60:)
D G H I quadrado(3,60:)
J = projecção(G, linha(A,B))
desenhar(A,B,C,D)
desenhar(C,E,F,G)
desenhar(D,G,H,I)
desenhar(segmento(G,J), tracejado)
desenhar(segmento(G,A), ponteadado)
desenhar(segmento(G,B), ponteadado)
desenhar(segmento(D,E), ponteadado)
desenhar(segmento(C,I), ponteadado)
```

Figura 3: xeukleides, modo de edição




Figura 4: xeukleides, modo de visualização

```

desenhar(c,0:,180:)
desenhar(A,B,C)
marca(A,C,B,recto)

```

o ponto x de um valor inicial de 45 vai poder tomar todos os valores de 0 a 180 com saltos de 2, sendo que o seu movimento vai-se processar na «horizontal», a movimentação é possível após o pressionar da tecla C pelo utilizador.

Tentando, com um série de imagens, ilustrar o movimento do ponto C definido à custa da entidade variável x , partindo do ponto inicial e movimentando o ponto para a esquerda através da tecla correspondente ter-se-ia algo como:





Figura 5: Teorema de Tales - movimentação

3 O eukleides na Sala de Aula

A possibilidade de utilização deste sistema num ambiente de ensino advém da facilidade da sua utilização, assim como das suas capacidades de visualização de construções da Geometria Euclidiana. A título de ilustração dessas capacidade vamos de seguida apresentar um esboço da demonstração do Teorema de Pitágoras no qual o *eukleides* joga o seu papel.

3.1 Demonstração do Teorema de Pitágoras

Teorema 1 (Teorema de Pitágoras) *Se $\triangle ABC$ for um triângulo rectângulo de hipotenusa \overline{BC}*




então $a^2 = b^2 + c^2$.


Na demonstração deste resultado o *eukleides* pode ser usado como um auxiliar precioso na visualização dos diferentes passos a dar até a conclusão que se pretende obter.

Demonstração

Dado o triângulo acima referido, considere-se um quadrado de lado $b + c$



de seguida divide-se o quadrado em quatro cópias do triângulo dado e num quadrado cujo lado é igual a a , a hipotenusa do triângulo.



calculado a área do quadrado de dois modos diferentes têm-se,

$$Q = (b + c)^2 \quad \text{e} \quad Q = 4\left(\frac{1}{2}bc\right) + a^2$$

ou seja,

$$\begin{aligned} (b + c)^2 &= 4\left(\frac{1}{2}bc\right) + a^2 \\ b^2 + 2bc + c^2 &= 2bc + a^2 \\ b^2 + c^2 &= a^2 \end{aligned}$$

□

Acresce dizer que numa utilização/apresentação utilizando um computador poder-se-ia acrescentar interação, fazendo mover os pontos que definem o triângulo, ilustrando deste modo a generalidade do resultado para um qualquer triângulo rectângulo.

4 Conclusões

O sistema `eukleides` é um sistema de fácil utilização, mas poderoso nas suas capacidades. A sua ligação com o sistema \LaTeX dá-nos a possibilidade de facilmente incluir figuras geométricas em textos matemáticos em que a qualidade tipográfica está fora de questão. Por todas as razões expostas ao longo do texto julgamos que este é um sistema que merece uma «vista de olhos» [2, 3] de todos os leitores da *Gazeta de Matemática*.

Referências

- [1] Leslie Lamport. *LaTeX: A Document Preparation System*. Addison-Wesley Publishing Company, Reading, Massachusetts, 2nd edition, 1994.
- [2] Christiam Obrecht. Eukleides. <http://perso.wanadoo.fr/obrecht/>.
- [3] Pedro Quaresma. EukleidesPT. <http://gentzen.mat.uc.pt/~eukleides>.
- [4] Pedro Quaresma. *Introdução ao LaTeX*. Escolar Editora, 1996.